

# 『動学マクロ経済学へのいざない』

## 正誤表

蓮見 亮

2022年8月9日

### 初版第1刷正誤表

箇所	(誤)	(正)
p.10 脚注7	(差替)	<p>(1.9) 式の両辺から <math>k^*</math> を引くと</p> $k_{t+1} - k^* = \frac{1 - \delta}{(1 + g)(1 + n)}(k_t - k^*) + \frac{sk_t^\alpha - (g + n + \delta)k^*}{(1 + g)(1 + n)}$ <p>となるが, <math>k_t &gt; k^*</math> の場合, <math>sk_t^\alpha &gt; s(k^*)^\alpha = (g + n + \delta)k^*</math>, <math>sk_t^\alpha &lt; (g + n + \delta)k_t</math> より</p> $0 < \frac{1 - \delta}{(1 + g)(1 + n)}(k_t - k^*) < k_{t+1} - k^* < k_t - k^*$ <p>である. したがって <math>k_t</math> は下に有界かつ単調減少なので <math>k^*</math> に収束する. <math>k_t &lt; k^*</math> の場合も同様に示せる.</p>
p.37 7行目	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = 0$	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*, \lambda) = 0$
p.37 下から4行目	$\min_{\mathbf{x}}$	$\max_{\mathbf{x}}$
p.38 3行目	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = 0$	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*, \lambda) = 0$

p.46 脚注 12	(少しの差ではあるが)	(削除)
同	(加筆)	また, (2.48) 式の左辺を 0 とおいて $K$ について解くことにより, $K$ の上限 $K_{\max} = \left(\frac{\delta}{A_t}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$ が得られる.
p.50 図 2.9	(差替)	
p.50	(脚注追加)	<p>図 2.6 の <math>\Delta C_t = 0</math> は, (2.46) 式の <math>K_{t+1}</math> に (2.43) 式の右辺を代入して <math>C_t (= C)</math> について解くと</p> $C = AK_t^\alpha + (1 - \delta)K_t - K^*$ <p>なので, 厳密には右上がりの曲線である.</p>
p.50 下から 4 行目	$K_t \rightarrow \infty (t \rightarrow \infty)$ となるが,	$K_t \rightarrow K_{\max} (t \rightarrow \infty)$ となるが (脚注 12 参照),
p.71 2 行目	と (4.27) 式	(削除)
p.122 (6.41) 式	, $\alpha \in \mathbb{R}$	(削除)
p.138 (6.98) 式	$\ln(C_t) + \mu L^{\gamma+1}$	$\ln(C_t) - \mu L^{\gamma+1}$
p.150 10 行目	粘着的	粘着性
p.158 (7.52) 式 1 行目	$\sum_{i=0}^{\infty} \eta \left(\frac{\rho}{1-\rho}\right) \pi_{t+i}^2$	$\sum_{i=0}^{\infty} \eta \left(\frac{\rho}{1-\rho}\right) \beta^i \pi_{t+i}^2$
同式 2 行目	$\left(\frac{\eta \rho}{1-\rho}\right) \sum_{i=0}^{\infty} \pi_{t+i}^2$	$\left(\frac{\eta \rho}{1-\rho}\right) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \pi_{t+i}^2$
p.158 (7.53) 式	$\sum_{i=0}^{\infty} \pi_{t+i}^2$	$\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \pi_{t+i}^2$

p.168 下から 5 行目	ボレル集合族 $\mathcal{B}$	$\mathbb{R}$ 上のボレル集合族 $\mathcal{B}$
p.190 下から 2 行目	ただし，次節の例では $R$ は $\theta$ に依存しない.	(削除)
p.192 (8.72) 式	, $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	(削除)
p.192 下から 2 行目	Blanchard and Kahn の方法	Sims の方法
p.193 (8.73) 式	$R$	$R(\theta)$
p.199	[2] に追記	(邦訳：和合肇・松田安昌 訳『状態空間モデリングによる時系列分析入門』シーエーピー出版, 2004)
	[11] に追記	(邦訳：赤堀次郎・原啓介・山田俊雄 訳『マルチンゲールによる確率論』培風館, 2004)

初版第 2 刷正誤表

p.10 脚注 7	(差替)	<p>(1.9) 式の両辺から <math>k^*</math> を引くと</p> $k_{t+1} - k^* = \frac{1 - \delta}{(1 + g)(1 + n)}(k_t - k^*) + \frac{sk_t^\alpha - (g + n + \delta)k^*}{(1 + g)(1 + n)}$ <p>となるが, <math>k_t &gt; k^*</math> の場合, <math>sk_t^\alpha &gt; s(k^*)^\alpha = (g + n + \delta)k^*</math>, <math>sk_t^\alpha &lt; (g + n + \delta)k_t</math> より</p> $0 < \frac{1 - \delta}{(1 + g)(1 + n)}(k_t - k^*) < k_{t+1} - k^* < k_t - k^*$ <p>である. したがって <math>k_t</math> は下に有界かつ単調減少なので <math>k^*</math> に収束する. <math>k_t &lt; k^*</math> の場合も同様に示せる.</p>
p.37 7 行目	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = 0$	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*, \lambda) = 0$
p.37 下から 4 行目	$\min_{\mathbf{x}}$	$\max_{\mathbf{x}}$
p.38 3 行目	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = 0$	$\frac{\partial L}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*, \lambda) = 0$
p.122 (6.41) 式	, $\alpha \in \mathbb{R}$	(削除)
p.150 10 行目	粘着的	粘着性
p.190 下から 2 行目	ただし, 次節の例では $R$ は $\theta$ に依存しない.	(削除)
p.192 (8.72) 式	, $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	(削除)

p.192 下から 2行目	Blanchard and Kahnの方法	Simsの方法
p.193 (8.73) 式	$R$	$R(\theta)$
p.199	[2]に追記	(邦訳：和合肇・松田安昌 訳『状態空間モデリングによる時系列分析入門』シーエーピー出版, 2004)
	[11]に追記	(邦訳：赤堀次郎・原啓介・山田俊雄 訳『マルチンゲールによる確率論』培風館, 2004)